AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE

Bulletin technique

ARBORICULTURE AB

Bulletin n° 18 / 17 juillet 2018

Actualité

Techniques culturales simplifiées, Semis direct, Couverts végétaux, Viticulture de précision

Détail et inscription sur :

www.lot-chambre-agriculture.fr ou au 05.65.23.22.22

Fruits à pépins

▪ POMMIER-POIRIER

Maladies de la suie et crottes de mouche

Renouveler la protection avant une pluie, ou toutes les trois semaines en l'absence de pluies, avec du cuivre métal (100g /ha). Tous les 50 mm de pluviométrie intervenir en stop avec ARMICARB (3 kg/ha) + 3 kg de soufre. Ce traitement a aussi un effet secondaire sur des maladies de conservation type monilioses, mais pas sur Gloesporiose ou Chollétotrichum.

Maladies de conservation et Black-rot

Dans les parcelles touchées les traitements soufre+cuivre, avant une période pluvieuse, ont un effet secondaire pour limiter le développement de cette maladie.

Feu Bactérien

Profiter du retour de conditions chaudes et sèches pour enlever les symptômes encore présents en arrachant les pousses à la main.

Pucerons lanigères

Aphelinus mali est maintenant bien présent dans les vergers et régule les populations de pucerons lanigère dans toutes les situations.

Capua

Le second vol est en cours.

Dans les parcelles attaquées en 2017 surveiller la présence de larves et intervenir avec un B.T. en cas de détection.

Zeuzère

Le vol est en cours.

Sur jeunes vergers et si plus de 5% des arbres présentaient des attaques en 2017 intervenir avec DELFIN (100g/hl), si le dernier traitement remonte à plus de 10 jours ou a été lessivé par les pluies d'orage.

Carpocapse

Nous sommes sur le pic des éclosions de la deuxième génération. *Sur toutes les parcelles prévoir une intervention spécifique cette semaine: CARPOVIRUSINE 2000/EVO 2 à 0.1 l/hl, ou MADEX TWIN/PRO à 0.01 l/h.*

Tordeuse Orientale

Nous sommes sur le pic d des éclosions de la G3. *Intervenir sur toutes les parcelles avec CARPOVIRUSINE 2000 à 0.1 l/hl, ou MADEX TWIN à 0.01 l/hl ou DELFIN 100 g/hl ou DIPEL DF 100 g/hl. Préférer le DELFIN ou DIPEL si présence de Capua ou Zeuzère.*

Bulletin rédigé par la Chambre d'Agriculture du Tarn-et-Garonne en collaboration avec : Syndicat de Défense AOP Chasselas de Moissac

Chambre d'Agriculture 82 - 130 avenue Marcel Unal 82017 Montauban - 05 63 63 30 25 - www.agri82.fr
La Chambre d'Agriculture 82 est agréée par le ministère chargé de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques (agrément n° MP01929).

Ce bulletin fournit un conseil pour les parcelles de la zone géographique ci contre et s'appuie sur l'analyse de risque du BSV consultable sur le site internet http://www.agri82.fr. Les informations règlementaires sur les spécialités commerciales et les méthodes alternatives sont disponibles dans le Guide Arbo. Cette action de diffusion est cofinancée par l'Agence de l'Eau Adour Garonne, le Conseil Départemental 82 et par l'Etat au travers du Casdar.
Crédit photos (sauf mention contraire) : Chambre d'Agriculture 82.

OPE.COS.ENR n°17

Fruits à noyaux

▪ PRUNIER

Carpocapse- Tordeuse orientale

Pics des éclosions de la deuxième génération du carpocapse des prunes et des éclosions de la de la troisième génération de tordeuse orientale.
Dans les vergers avec des variétés tardives, même confusés, il est possible de positionner MADEX TWIN (virus de la granulose à 0.01l/hl, DAR 1 jour) ou DELFIN ou DIPEL ou LEPINOX plus (B.T. à 100g/hl, DAR 3 j).

▪ ABRICOTIER - PECHE NECTARINE

Tordeuse orientale

Nous sommes sur le pic des éclosions de la G3. Maintenir *une protection sur les parcelles non-confusées tous les 10 jours avec CARPOVIRUSINE 2000 (virus de la granulose, 0.1 l/hl, DAR 3 j) ou MADEX TWIN (virus de la granulose, 0.01 l/hl, DAR 1j) ou DELFIN ou DIPEL DF g/hl ou LEPINOX plus (B.T. 100g/hl, DAR 3 j)*

TOUS FRUITS A NOYAUX

Monilioses :

Trois semaine avant récolte les traitements cuivre métal (100 à 150 g/ha) +soufre (3 à 4 kg/ha), avant une pluie, ont un effet limitant sur monilia. L'ajout de Lithotame limite la phytotoxicité sur fruits à noyaux.

Dès la fin d'un épisode pluvieux l'ARMICARB est homologué sur monilioses des fruits en pêcher à la dose de 5 kg/ha, à positionner en stop.

Raisin de table

Oïdium

Maintenir la protection

Renouveler la protection avec un soufre mouillable à 3 kg/ha.

Mildiou

Renouvelez au plus près des orages afin de couvrir le maximum de jeunes feuilles.

Protéger en apportant 100g/ha de cuivre métal avec *Bouillie Bordelaise RSR Disperss ou CHAMP FLO Ampli ou FUNGURAN-OH.*

Thrips

Pratiquer des battages régulièrement afin de surveiller leur remontée sur les souches.

Bulletin rédigé par la Chambre d'Agriculture du Tarn-et-Garonne en collaboration avec : Syndicat de Défense AOP Chasselas de Moissac

Chambre d'Agriculture 82 - 130 avenue Marcel Unal 82017 Montauban - 05 63 63 30 25 - www.agri82.fr
La Chambre d'Agriculture 82 est agréée par le ministère chargé de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques (agrément n° MP01929).

Ce bulletin fournit un conseil pour les parcelles de la zone géographique ci contre et s'appuie sur l'analyse de risque du BSV consultable sur le site internet http://www.agri82.fr. Les informations règlementaires sur les spécialités commerciales et les méthodes alternatives sont disponibles dans le Guide Arbo. Cette action de diffusion est cofinancée par l'Agence de l'Eau Adour Garonne, le Conseil Départemental 82 et par l'Etat au travers du Casdar.
Crédit photos (sauf mention contraire) : Chambre d'Agriculture 82. OPE.COS.ENR n°17